




Gulrost – diskussionspunkt

**Gunilla Berg
Jordbruksverket
Växtskyddscentralen Alnarp**



Höstvete – rost 1988-2014


VSC varningsfält Skåne, Blekinge, Halland



Områdesvis utveckling av gulrost i höstvetete 2014

(Antal fält med sorterna Audi, Cumulus, Kranich)

Källa: PoV fält VSC Alnarp



Gulrost – dåligt samband mellan angrepp på hösten och efterföljande år

November 2011

- Gulrost förekom i alla sorter förutom Stigg och Mariboss i flera sortförsök
- gulrostangreppen hade ingen betydelse för utvintringen
- **Men stora angrepp 2012**

November 2012

- Angrepp förekom ex sortförsök i Uppåkra fanns gulrost i 37 av 49 sorter –
- **Men kall och blåsig vår 2013 och angreppen utvecklades sent - mitten av maj**

November 2013

- Endast enstaka angrepp förekom i sortförsök och fält
- **Men mild vinter + stort smittotryck i norra Europa gav mycket starka angrepp**

November 2014

- 
- Mycket rost förekommer, både gulrost och brunrost i både sortförsök och lantbrukarfält. Svårt att skilja särskilja rostarerna åt på hösten. Gulrost förekommer med säkerhet i ex sorterna Audi och Brons.
 - **2015??**